

Zineryt® oplossing voor cutaan gebruik
Informatie voor de gebruiker

Wij raden u aan deze bijsluiter te lezen, ook indien u Zineryt al enige tijd gebruikt.
De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.

Wat is Zineryt en hoe werkt het?

Samenstelling

Zineryt bevat als werkzame stof 40 mg per ml erytromycine in de vorm van een zink complex. Deze verbinding is opgelost in ethanol waaraan een stof met een verzachtende werking op de huid is toegevoegd. De hulpstoffen zijn: acetaat, diisopropyl-sebacaat en ethanol.

Hoe ziet Zineryt eruit en hoe is het verpakt?

Zineryt is een heldere, kleurloze naar alcohol ruikende vloeistof. Deze vloeistof zit in een flacon waar een depper op zit. Met deze depper kan Zineryt op de huid worden aangebracht. De depper is afgeschermd door een draaidop. De flacon zit in een geel/grijs/witte verpakking met opdruk Zineryt. Zineryt wordt in het algemeen kant en klaar door de apotheker afgeleverd.

Hoe werkt Zineryt?

Zineryt bevat het antibioticum erytromycine en zink. Erytromycine kan de groei van bacteriën remmen, die een rol spelen bij het ontstaan van puistjes. Zink versterkt het effect van erytromycine bij de behandeling van acne.

Registratiehouder en fabrikant

Zineryt is in het register ingeschreven ten name van Astellas Pharma B.V. en wordt gemaakt door Astellas Pharma Europe B.V., Leiden. Zineryt is uitsluitend op recept verkrijgbaar en heeft als registratienummer RVG 09897.

Waarvoor kan Zineryt gebruikt worden?

Zineryt kan gebruikt worden bij de behandeling van matige tot ernstige vormen van acne (jeugdpuistjes), waarbij plaatselijke behandeling zonder antibiotica geen of onvoldoende resultaat heeft opgeleverd of niet verdragen wordt.

Wat u moet weten vóór u Zineryt gaat gebruiken

Wanneer mag u Zineryt niet gebruiken? U mag Zineryt niet gebruiken wanneer U overgevoelig bent voor erytromycine of andere antibiotica uit dezelfde groep, zink of voor één van de hulpstoffen in Zineryt. U dient uw arts te waarschuwen als U voor één van deze stoffen overgevoelig bent.

Voorzorgen bij het gebruik van Zineryt

Zineryt mag niet in aanraking komen met de ogen, het slijmvlies van de neus of van de mond. Het zal op deze plaatsen namelijk een brandend en prikkelend gevoel geven. Als dit toch gebeurt dan dient U direct te spoelen met koud of lauw water en uw arts te waarschuwen. De inhoud van de flacon kan bij morsen vlekken geven op textiel en dergelijke.

Wisselwerking

Er zijn tot dusver geen wisselwerkingen bekend. Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding:

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Voor zover bekend kunt U Zineryt zonder gevaar volgens de voorschriften gebruiken tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Het is niet te verwachten dat Zineryt invloed heeft op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen

Geen.

Aanwijzingen voor het gebruik van Zineryt

Hoe dient Zineryt gebruikt te worden?

U dient 2 maal per dag een laagje Zineryt met de depper aan te brengen op de te behandelen huid met puistjes.

Zineryt bij voorkeur 's morgens (vóór het eventueel aanbrengen van make-up) en 's avonds (na het verwijderen van eventuele make-up) ná het wassen van de huid aanbrengen. Als u het laagje even laat opdrogen wordt dit onzichtbaar. Zineryt leidt in de meeste gevallen na 10-12 weken tot een verbetering van de aandoening. Ziet U een verslechtering neem dan contact op met uw arts.

Zineryt vergeten aan te brengen?

Wanneer u Zineryt een keer vergeet aan te brengen kunt u gewoon verder gaan met Zineryt zoals u gewend was. U hoeft dus niet de keer die U vergeten bent extra aan te brengen.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Zineryt bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bij gebruik van Zineryt zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Soms komen voor (bij meer dan 1 op de 1.000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten):

- Jeuk, droge huid en huidschilfering.
- Roodheid van de huid, huidirritatie en branderig gevoel op de huid. Dit is meestal niet ernstig en trekt vanzelf weg.

Immuunsysteemaandoeningen:

Zeer zelden komen voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

- Overgevoeligheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Zineryt bewaard worden?

Zineryt mag niet meer worden gebruikt na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven. Bewaar Zineryt bij een temperatuur beneden de 25°C in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd. De kant en klare oplossing kan 8 weken bewaard worden. Als verdere behandeling met Zineryt nodig is, dan dient uw arts een nieuwe flacon voor te schrijven. Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie

Door wie wordt Zineryt op de markt gebracht? Zineryt wordt in Nederland op de markt gebracht door:

Astellas Pharma B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden

Telefoon: 071 - 545 58 54 Telefax : 071 - 545 58 50

Algemene wenken

- Uw arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven. Derhalve dient u zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft.
- Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf nooit het geneesmiddel van een ander.
- Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
- Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.
- Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).

Instructies voor de bereiding van de kant en klare oplossing Zineryt door de apotheker

1. In de geel/grijs/witte doos zitten twee flacons en een depper. Verwijder de doppen van beide flacons. Bewaar de dop van de flacon met poeder.
2. Giet de vloeistof uit de ene flacon over in de flacon met de poeder. De lege flacon kunt u weggooien.
3. Schroef de overgebleven dop op de flacon, waarin de poeder met de vloeistof zit.
4. Schud deze flacon onmiddellijk gedurende 1 minuut.
5. Draai de dop van de flacon en breng de depper over in de dop.
6. Druk nu de dop, met daarin de depper, op de volle flacon en draai deze vast.
7. U kunt nu de dop van de flacon afdraaien en controleren of de depper stevig op de flacon zit. Druk zonodig de depper nog stevig aan.
8. De oplossing is tot 8 weken na de bereiding houdbaar. Plak deze datum op de flacon.

Datum laatste wijziging

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2013